

عنوان الكتاب : حديقة الأزاهير

المؤلف : حسين البابلي

سنة النشر : ١٩٣٧

رقم العهدة : د ٨٥٧٧

الـ ACC : ٩٤٠

عدد الصفحات : ٩٥

رقم الفيلـم : ١٧

١٥٠
١

A-C ٩٤٠

حدائقة الازاهير


تأليف

حسين الباطي

مدرس بكلية الزراعة

- A-C / ٩٤٠
- ٨٤١ / ٨٥٧٧
- ٢٠٢١ / ٦٤٥,٩

cac - s
٨٥٧٧



The Flower Garden

BY

H. E. BABLY

FACULTY OF AGRICULTURE .

Egyptian University

A

Abutilon

Malvaceae .

شجيرة تتكاثر بالعلقة وتزهو في الربيع ومن أنواعها *A. Darwinii* وزهرتها برتقالية فاتحة معروفة باللون الاحمر ، *A. Striatum* وزهرته برتقالية محمرة معروفة باللون القرمزي الغامق .

Acacias

Leguminosae.

شجيرات وأشجار . الانواع عديدة جداً وأكثرها وجوداً بمصر (١) السنط البلدي *A. arabica* وهي شجرة خشبية تستعمل أخشابها في صنع بعض الآلات الزراعية . كثيرة الأشواك . وقد تزور كسياج للتمتع . نورتها صفراء ثمارها قرظية تستعمل للدايعة وتتكاثر بالبذور في مارس . وأوراقها ريشية (٢) *A. Calamifolia* شجرة جذابة غزيرة الازهار . أوراقها أبرية الازهار كروية صفراء تزهو في الربيع والخريف . (٣) *A. Farnesiana* شجرة كثيرة التفرع تزهو في الربيع والخريف نورتها صفراء غامقة عطرية جداً وتعرف باسم القنتة .
(٤) *A. Saligna* فروعها مدلاة أزهارها صفراء ترى بكثرة في الربيع وأوراقها رحيمة مستديمة الخضرة .

Acalypha

Euphorbiaceae

شجيرة أوراقها ملونة تزور في الدوائر أو منفردة في المسطحات وتستعمل أحياناً كسياج للزينة . داغمة الخضرة . تتكاثر بالعلقة . ومن أنواعها *A. Godseffiana* . وأوراقها طويلة رقيقة غير منتظمة حافتها بيضاء مصفرة كذلك يوجد نوع آخر اسمه *A. marginata* . وأوراقها حمراء قرنفلية ذات حافة بلون الكرم منتبهة بلون قرمزي وتعتبر من النباتات الورقية وقيمتها في جمال أوراقها .

Acanthus Mollis

Acanthaceae

نبات عشبي أوراقه كبيرة جذابة يزهو في ابريل إلى يونيو حوامله الزهرية ذات لون أرجواني مبيض والتكاثر بالسوق الأرضية وقيمتها في أوراقه وبشبهه الا ماكن الظليلة وأحياناً يزرع على مقربة من الماء .

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه كلمات في رسالة صغيرة عن كثير من نباتات الرياض والمتنزهات رتبتهما في ايجاز وتواضع . وسلكت سبيل البساطة في تكوينها وتأليفها . وها أنذا أقدمها هدية مني إلى ولدي طارق الباب إلى م

حسين البابلي

رمضان ١٣٥٦ هجرية

نوفمبر ١٩٣٧

Agave Rigida . Var . Sisalana .

وأوراقه تحوى على ألياف تستعمل فى صناعة الاحبال
وللأجاف أنواع أخرى عديدة يستخرج من بعضها أنواع من الخورالمكسيكية
ويتكاثر الأجاف بواسطة الخلفة

Ageratum

Compositae

«البرجان» حولى شتوى يزهر فى الربيع والشتاء . تزرع بذوره فى أغسطس*
يصل ارتفاعه إلى حوالى نصف متر ولون الأزهار زرقاء فاححة نوعا . أو بيضاء .
ومنه أنواع قصيرة .

Albizzia Lebbek .

Leguminosae

شجرة «البلخ» أو «دقن الباشا» تزرع كشجرة للاظل . متساقطة الاوراق
أوراقها ريشية . أزهارها عطرية بيضاء مخضرة تتكاثر بالعقلة والبذور تزهى فى
الصيف والخريف . تصاب بشدة بالبق الدقيق . ولذلك أوشكت أن لاترى إلا قليلا
ويوجد من الابزيا أنواع أخرى عديدة .

Allamanda

Apocynaceae

متسلق أزهاره صفراء بديعة يزهر فى الربيع والصيف والخريف ومن أنواعه
المعروفة

Allamanda Cathartica var Schottii .

ويتكاثر بالعقلة والترايد .

Aloe

“ Liliaceae ”

نبات عصارى يعرف باسم الصبار أوراقه لحمية ومن أنواعه A. Arborecens
وأزهاره حمراء تزي فى الخريف . ويوجد نوع آخر اسمه A . Vera . ويستخرج منه
عصير الصبر وهو مسهل ومقو للمعدة ويستعمل لبعض أمراض السكبد وقد تستعمله
المراضع للنظام .

Acocanthera Spectabilis

Apocynaceae

شجيرة أوراقها بسيطة خضراء داكنة تزهى فى أوائل الربيع أزهارا عطرية
فياحة بيضاء فى مجاميع تتكاثر بالبذور فى مارس وثمرتها داكنة فى حجم الزيتون

Acroclinium

Compositae

حولى شتوى تزرع بذرته فى أغسطس ويزهر فى الشتاء والربيع وأوانه عديدة
منها الابيض والوردى والاحمر الوضاء ويصل ارتفاعه إلى حوالى نصف متر
أوأكثر .

Adhatoda Vasica

Acanthaceae

شجيرة دائمة الخضرة تتكاثر بالعلة أزهارها بيضاء تزهى فى الربيع والخريف .
تزرع فى الدواثر وتستعمل فى كثير من الاحايين كسياج للزينة .

Adiantum .

Polypodiaceae

«كسيرة البئر» . عشب سرخسى ينمو فى الأماكن الظليلة الرطبة يتكاثر
بواسطة الجراثيم ويحزمة النبات . يرى بكثرة فى الصوب الزجاجية . وفى الأماكن
الظليلة الرطبة ويتأثر كثيرا من برودة الجو شتاء

Adonis

Ranunculaceae

حولى شتوى تزرع بزوره فى شهر أغسطس وسبتمبر ويزهر فى الربيع ولون الزهرة
قرمزي ...

Agapanthus Umbellatus

Liliaceae .

نبات يصلى زهرى يزهر صيفا - أزهاره زرقاء فى مجاميع . يتكاثر بالتجزئة فى
أواخر الشتاء .

Agave

Amaryllidaceae

نبات يشبه الصبار المعروف باسم Aloe موطنه أمريكا الاستوائية ومن أنواعه
المشهورة السيل واسمه

Amaryllis **Amaryllidaceae**
في مقدمة الابصال الزهرية من حيث جمال أزهاره البوقية . يزهر في الربيع
وأزهاره حراء أو بيضاء - وتزرع أبصالة في أكتوبر ونوفمبر في أرض خفيفة
معنى بتسميدها. أوفى قصارى كبيرة .

Ampelopsis **Ampeliidae**
متسلق يرى بكثرة في الاسكندرية يتسلق بواسطة محالقه التصيرة أوراقه خضراء
لامعة . يصلح لتغطية الحوائط يتكاثر بالترافيد والبذور . ومنه النوع المعروف باسم
A. veitchii

Anchusa **Boraginaceae**
حولى شتوى يزوع في يوليو . يصل ارتفاعه إلى حوالى نصف متر أو أقل
أزهاره زرقاء جميلة . والتحل مولم بأزهاره . يزهر في الشتاء والربيع .

Andropogon Citratus **Gramineae**
يعرف باسم حبشيشه الليمون يستخرج من أوراقه زيت السترونيلا وأوراقه رفيعة
يصل ارتفاعه إلى حوالى أربعة أقدام أو أكثر يتكاثر بالتجزئة .

Anemone **Ranunculaceae**
يدخل ضمن مجموعه الابصال الزهرية يزهر في الربيع تزوع جنوره اللرية
في أكتوبر ونوفمبر من قصارى ١٥ و ٢٠ تربتها خفيفة ومعنى بتسميدها أو يزوع
في الاحواض

Anisacanthus Virgularis
شجيرة صغيرة كثيفة النمو . أزهارها صغيرة أنبوبية لونها أحر برتقالي ترى منزهرة
في الخريف تتكاثر بالبذور في شهر مارس . ويلاحظ قصها بعد موسم الزهر .

Antholyza Aethiopica **Iridaceae**
نبات بصلى زهرى . يرى مزهرا في الربيع أوراقه تشبه السيف . شماريحه
الزهرية محملة في نظام بديم بأزهار صغيرة حراء برتقالية .

Alonsoa **Scrophulariaceae**
حولى شتوى تزوع بزته في أغسطس وسبتمبر . لون أزهاره برتقالية محمرة
يزهر في الربيع

Alpinia **Scitamineaceae**
نبات نصف مائى يتكاثر بتجزئة الريزومات أزهاره صدفية مشربة
باللون البرتقلى رائحتها عطرية . أوراقه تشبه أوراق الكنا ولكنها أرفع والنوع
المعروف اسمه . Nutans . A . يزهر في أوائل الصيف - يحسن زراعته في أماكن
نصف ظلية . يصل ارتفاعه إلى حوالى ٢ - ٣ متر .

Alsophila **Filices**
نبات سرخسى على شكل شجرة صغيرة . منه النوع المعروف باسم A . Australis
يشاهد بمصر في الصوب الزجاجية . ومنظره غاية في الابداع

Alternanthera **Amarantaceae**
عشبة صير أوراقه مشربة بالأصفر والأحمر والأخضر يزوع حول الأحواض
الزهرية . يوالى بالقص . يتكاثر بالعقلة

Althaea **Malvaceae**
حولى شتوى تزوع بفرته في يوليو أزهاره كبيرة الالوان عديدة . موعده
الازهار في الربيع . يصل ارتفاعه إلى أكثر من مترين

Alyssum **Cruciferae**
حولى شتوى تزوع بزته في يوليو أزهاره صغيرة في مجاميع بيضاء . يزهر
في الشتاء والربيع . يزوع أحيانا على طول الاحواض الزهرية . رائحتها عطرية
خفيفة . لايزيد ارتفاعه عن ١٥ - ٢٠ سم

Amaranthus **Amarantaceae**
حولى صيفى تزوع بذره في مارس وأبريل وجماله في أوراقه المحمرة يوالى
بالقص من وقت لآخر ويرى مورقا في الصيف والخريف .



Araucaria excelsa

Araucaria Exelca .

Anthurium

Aroideae

يزرع لجمال اوراقه ويرى داخل الصوب الزجاجية ويعتبر في مقدمه نباتات الصوب من حيث الجمال والشكل . ويتكاثر بواسطة الترايد المواتية .

Antigonon leptopus

Polygoniaceae

متسلق أزهاره رشيقة حمراء قرمزية صغيرة في مجاميع تتساقط أوراقه قليلا في الشتاء . يزهر في الربيع والصيف والخريف يتكاثر بالبذور ويوجد صنف آخر منه اسمه . A. L. var Albus . أزهاره بيضاء

Antirrhinum.

Scrophulariaceae .

حولى شستوى تزرع بذوره في يونيو ويوليو يزهر في الشتاء والربيع ومنه أنواع تصل إلى ارتفاع متر وأخرى إلى حوالى نصف متر كما توجد أنواع أخرى لارتفاع عن ارتفاع ٣٠ سم . الالوان عديدة . يرى بكثرة في الحدائق ويعرف باسم حنك السبع .

Aquilegia

Ranunculaceae .

حولى شتوى تزرع بذوره في يوليو زهرته تشبه الطير عديد الالوان لا يصلح للقطف . يربى في قصارى غالبا . يزهر في الربيع . جميل حقا

Aralia Papyrifera .

Araliaceae

شجيرة جميلة تصلح للزراعة في الاماكن الظليلة أوراقها كبيرة راحية منمضمة الازهار بيضاء بلون السكرم في مجاميع ترى زاهية ترى الخريف تتكاثر بالعقلة .

Araucaria

Coniferæae .

شجرة جميلة ترى بكثرة في حدائق الاسكندرية . تفرعها أفقى في نظام مخروطى بديم . وهي في مقدمة أشجار الزينة جمالا يصل ارتفاعها إلى حوالى ٣٠ متراً أو أكثر . ومن الانواع المشهورة بمصر A. Exelca والتكاثر بالبذور

Arctotis

Compositæae .

حولى شتوى تزرع بذوره في يوليو . ويرى مزهراً في الشتاء والربيع . أزهاره بيضاء أو صفراء برتقالية يصل ارتفاعه إلى حوالى نصف متر أو أقل .



Aralia papyrifera

Aralia . Papyrifera

Arundo — Donax .

Gramineae

نوع من غاب الزينة منه النوع المعروف باسم A . D - Variegata أوراقه مسيرة بخطوط بيضاء لامعة يتكاثر بتجزئة الزيومات الأرضية . ويزرع عادة بجوار الماء .

Asclepias Curassavica

Asclepiadiaceae

عشب تصلح زراعته في الجباليات يقرط عادة بعد الأزهار ويرى مزهرا في الربيع . وأزهاره حمراء برتقالية ذات متك صفراء . ويتكاثر بالبذور . ويعرف بالنبات الحريري ويفرز مادة لبنية .

Asparagus

Liliaceae

عشب الزينة أوراقه رفيعة منه النوع البلدي A . Sprengeri وأوراقه رفيعة حادة أفرعه تمتد لحدما . ترى مدلاه إلى أسفل في صورة جذابة يزرع عادة في الاصص في أما كن نصف ظلية . ومنه النوع الفينو A . Plumosus وأوراقه تشبه أوراق بعض السرخسيات . متسلق رشيق ينمو في الاما كن التي لاتصلها الشمس إلا قليلا .

Asphodelus

Liliaceae .

من الأبال المنشرة في جهات مربوط ومنه النوع . A . Microcarpus ويستخرج من جذوره اللونية صبغة صفراء تستعمل في تلك الجهة لصبغ السجاجيد

Aspidistera

Liliaceae .

نبات ورق تزين به الابهاء . يجود في الاما كن الظليلة فقط يرى عادة في الاصص . يتكاثر بالتجزئة . أوراقه كبيرة لامعة . ومنها النوع المعروف باسم

A . Lurida

Aspidium

Filices .

نوع من السرخسيات يرى في الصوب الزجاجية . يتكاثر بالجراثيم

Areca

Palmaceae

فخيل للزينة . ساقها أملس نسبياً وأمسك نوعا عند القاعدة . الأوراق ريشية بديعة . يصل ارتفاعها إلى حوالي ٢٠ قدم أو أكثر . تتكاثر بالبذور ومن أنواعها المشهورة A . Catechu

A renga Saccharifera

Palmaceae

نخلة للزينة جميلة ساقها سميقة موطنها الملايا . تلائمها الاما كن الظليلة . يستخرج من أوراقها عصير سكري .

Argyrea

Convolvulaceae

متسلق أوراقه فضية من أسفل . ومنها نوعان معروفان أحدهما Speciosa A . وأوراقه لوونها فضي مطن زغي وأزهارها قرنفلية مبيضة كبيرة نسبياً ترى في الصيف والخريف . وهذا النوع يتكاثر بالبذور . أما النوع الثاني واسمه Splendens A . أوراقه أصفر ولوونها فضي لامع والأزهار أصفر ولوونها وردى باحت وتتكاثر بالعقلة يزرع لجمال أوراقه الفضية

Aristolochia

Aristolochiaceae

متسلق أوراقه قلبية منه النوع A . Braziliensis . أزهاره تشبه الطائر لوونها سنجابي مرقط والرائحة غير مقبولة تزهر في الربيع والخريف — والنوع . A . Elegans . وأزهاره تشبه الحمار ترى في الربيع والخريف والتكاثر بالبذور .

Artemisia

Compositae

« الشيح » عشب أنواع كثيرة منها ما ينمو بريا ويستعمل طيباً لطرد الديدان المعوية وخلافة ومن أنواعه :

A . Herba Alba

الشيح الخراساني

A . Judaica

الشيح البلدي

Arundinaria

Graminoae

نوع من غاب الزينة أوراقه مسيرة بخطوط بيضاء . ساقه خضراء لامعة في صفرها صفراء اللون في كبرها يتكاثر بتجزئة الزيومات الأرضية .

ويتكاثر بتجزئه الكتلة الرزومية . ويوجد نوع من الغاب يصل ارتفاعه إلى حوالي ٢٠ متر يعرف باسم *Dendrocalamus Giganteus* ويوجد كذلك نوع لا يزيد ارتفاعه عن حوالي ثلاثة أمتار ترى سوقه خضراء ثم لائلب أن يسود لونها ويعرف باسم *Phyllostachys Nigra* يحسن زراعة الغاب بمجوار المياه

Barleria

Acanthaceae

شجيرة صغيرة دائمة الخضرة تزهر في الخريف والربيع تقص عادة بعد الأزهار الزهرة زرقاء أرجوانية *B. cristata* أو زرقاء محمرة *B. strigosa* أو بيضاء والتكاثر بالبذرة أو العقل .

Bauhinia

Leguminosae

شجرة تتساقط أوراقها في الشتاء . أزهارها ملونة بالابيض والاحمر الفساح والبنفسجي يزهر في الربيع . يتكاثر بالبذرة واكثر الانواع شيوعا *B. Variogata* ومن أصنافها *B. V. alla* وزهرتها بيضاء .

B. aucarnea

Liliaceae

ساقه تشبه اللوزق الاوراق طويلة رفيعةمدلاه . يزرع في الجبلديات والمساحات الخضراء ويعرف باسم *B. Recurvata* أو *Nolina Recurvata*

B. aumontia

Apocynaceae

متسلق قوى النمو دائم الخضرة أوراقه كبيرة يزهر في الربيع تتكاثر بالعقل والتراقيد . والنوع المعروف يسمى *B. Grandiflora*

Begonia

B. goniaceae

توجد أنواع كثيرة منها ما يمكن زراعته في الاحواض بالمدينة خصوصا في الاسكندرية . مثال ذلك

B. Semperflorens ويتكاثر بالبذور ومنها ما يربي في أصص داخل الصوب الزجاجية والخشبية مثال ذلك *B. Rex* وأوراقها فضية مزخرفة وتتكاثر بواسطة

Asplenium

Filices

نوع من السرخسيات يرى في الصوب الزجاجية يتكاثر بالجراثيم

Aster

Compositae

حولى شتوى تزرع بذرته في أغسطس ويرى مزهرا في الشتاء وألوان الأزهار عديدة . وهي على جمال عظيم . وتصلح للقطف .

Asler Novi - Belgii

عشب معمر أزهاره بنفسجية جميلة يزهر في الصيف والخريف . يتكاثر بتجزئة النباتات تصلح زراعته في الدوائر والجبلديات

Atriplex

Chenopodiaceae

شجيرة أوراقها صغيرة رمادية فضية معمرة دائم الخضرة يزرع كسباج يوجد في الأراضي الرملية ويمكن زراعته في الأراضي الملح . يتكاثر بالعقل والبذرة ومن أنواعه المعروفة *A. Lentiformis*

Azalea = Rhododendron

Ericaceae


شجيرة في مقدمة شجيرات الزينة جمالا . ترى عادة في أصص كبيرة وتستورد عادة من إيطاليا . دائمة الخضرة غزيرة الأزهار . ترى مزهرة في الربيع داخل الصوب الزجاجية أو الصوب الخشبية لون الأزهار بيضاء أو حمراء أو بجمية الخ .

B

Bambusa = Bambo

Gramineae


الغاب العادي واسمه *B. Vulgaris* وساقه خضراء لامعة طويلة والغاب الذهبي *B. V. var. Aureo Variegata* وساقه طويلة صفراء ذهبية مخططة بخطوط خضراء



Aristolochia Elegans

Aristolochia Elegans

Bellis Perennis



الورقة .

Bellis **Compositae**
حولى شتوى تزرع بذرته في سبتمبر لا يزيد طوله عن ١٥ - ٢٠ سم أزهاره
بيضاء أو حمراء أو وردية **B . Perennis**

Bignonia **Bignoniaceae**
يدخل تحت هذا الجنس عدة أنواع منها **B . venusta** متسلق دائم
الخضرة يزهر في الشتاء أزهاره برتقالية غزير الازهار يتكاثر بالعقلة
B . Unguis-cati متسلق دائم الخضرة يزهر في ابريل أزهاره صفراء . ثماره
رؤن طويلة . والتكاثر بالبذرة
B . Purpurea متسلق دائم الخضرة يزهر في ابريل أزهاره أرجوانية
يتكاثر بالعقل والبذور سريع النمو . قوى .
B . Jasminoides متسلق دائم الخضرة يزهر في الربيع والصيف أزهاره
بيضاء تتوسطها بقعة حمراء بتفسيحة يتكاثر بالعقل

Billbergia **Bromeliaceae**
يرى في الاماكن الظليلة وقد يرى في قصارى . والنوع المعروف بمصر
B . Vittata أوراقه طويلة كبيرة منحنية نهايتها ذات أشواك حمراء - الازهار
زرقاء ترى في الربيع التكاثر بواسطة الجذوة عند قاعدة النبات . لا يزيد
ارتفاع النبات عن حوالى ٨٠ سم .

Bixa orellana **Bixaceae**
وتعرف باسم شجرة الاناتو **Annatto tree** يستخرج من الطبقة المغلقة بالبذور
صبغة الاناتو المستعملة في تلوين الزبد . والجنين . وبعض أنواع الحرير كذلك .
الازهار قرنفلية . تتكاثر بالبذور .

Bombax Malabaricum **Bombacaceae**
شجرة القطن الحررى . تحتوى ثمارها على اوبار حريرية تستعمل في حشو
الوسادات . وهي شجرة كبيرة مسلحة بأشواك حمراء كبيرة ترى فروعها في محيطات
أزهارها حمراء قرمزية في الشتاء . متساقطة الاوراق تتكاثر بالبذور

Buddleia Loganiaceae
شجيرات سريعة النمو تستعمل أحياناً كأسيجة للزينة دأمة الخضرة تكاثرها بالعتلة ومن أنواعها *B. Asiatica* . وأوراقها خضراء باهتة أسفلها مبيض والأزهار بيضاء عطرية في مجاميع - *B. Madagascariensis* . ونموها قوى وأوراقها أكبر وأزهارها صفراء برتقالية
B. Variabilis الأزهار زرقاء خفيفة
Butea Frondosa . Leguminosae
شجرة نادرة الوجود أوراقها ثلاثية أزهارها قرمزية برتقالية ترى في الربيع التكاثر بالترقيد والبذور .

C

Cacalia Compositae
حولى شتوى قصير تزرع بذوره في يوليو وأغسطس أزهاره ترى في الشتاء والربيع ولونها أحمر برتقالى صغيرة جذابة .
Cactus (Cacti) Cactaceae
طائفة من النباتات المصرية شوكية غالباً لها مقدرة على كتنز الماء . موطنها أمريكا الاستوائية . وفي أكثر الأحوال لا يرى لها أوراق . أزهارها بوجه عام جذابة غريبة ومن أمثلتها *Cereus - Opuntia - Echinocactus*
Mammillaria - phyllocactus .
وتزوع عادة في جيليات تخصص لها .
Caesalpinia Leguminosae .
شجيرات أوراقها ريشية ترى مزهرة في الصيف والخريف وتقص عادة بعد التزهير والتكاثر بواسطة البذور ومن أنواعها :

Bougainvillea Nyctaginaceae .
شجيرات كبيرة تميل الى التسلق جمالها في قناباتها الزاهية وكثيراً ما تستعمل كشجيرة قاعة مشكلة مختلف الاشكال تبعاً لمتختلف الرغبات والاذواق ويدخل تحت هذا الجنس نوعان .
B. Glabra (١) ويتكاثر بالعتلة وشجيراته متكاثفة النمو والأوراق لامعة والقنابات أرجوانية وردية (باهتة) وموسم الزهيز معظم أوقات السنونونه الصنف
B. Glabra Var. Saenderiana

ويتميز عن الاول باللون (الداكن) في قناباته .
B. Spectabilis (٢) وهو النوع الشافى وأوراقه أكبر زغبية وفروعه شاردة قوية ويزهز في الشتاء والربيع ولون القنابات أرجوانى داكن زاهى ويتكاثر بالعتلة كذلك ومن أصنافه الشائمة *B. Spectabilis Var Lateritia* . ولون قناباتها أحمر طوبى أو دموى وتعرف باسم دم الفزال وتتكاثر بالترقيد وتزهز في الشتاء وبعض الربيع . - والبوجفيليا تعرف باسم الجهنمية
ومن الاصناف التى أدخلت حديثاً بمصر *B. Mrs Butt* . ولون قناباتها ياقوتى وتزهز معظم أوقات السنة وتتكاثر بالعتلة .

Brachycome Compositae
حولى شتوى قصير تزوع بزوره في يوليو ويزهز في الشتاء والربيع وأزهاره زرقاء أو موف أو أرجوانية .
Brahea Palmrceae
جنس من نخيل الزينة أوراقه مروحية لونها فضى رمادى جميلة للنساية . بطيئة النمو - تتكاثر بالبذور منتشرة نوعافى الاسكندرية
Branfelsia Americana
شجيرة بطيئة النمو أوراقها لامعة وأزهارها أنوبية بيضاء مصفرة عطرية ترهز في الربيع والتكاثر بالبذرة .

- (ويذاب فيها اللون الأحمر)
(C . Pulcherrima)
(ولون أزهاره حمراء مصفرة)
(C . Gilliesii)
(وأزهارها صفراء)
(C . sepiaria)

Caladium Aroideae

نبات درني ترى أنواعه داخل الصوب الزجاجية . ولأوراقه الكبيرة جمال ممتاز فتراها ملونة بألوان منسجمة جذابة وتتكاثر بالدرنات ويحتاج في تربته إلى عناية خاصة .

Calendula officinalis Compositae

حولى شتوى تزرع بذوره في يوليو وأغسطس ويرى مزهراً في الشتاء والربيع ولون أزهاره أصفر برتقالى أو أصفر ليمونى .

Calla — See Richardia

Calliopsis — see Coreopsis

Callistemon Lanceolatus Myrtaceae

شجيرة متوسطة الحجم أورانتها صغيرة رحيمة . التورة اسطوانية محمرة ترى في الربيع وتشبه فرشاة تنظيف الزجاجات — فروعها مدلاة — التكاثر بالبذور .

Calotropis Procera Asclepiadaceae

ويعرف باسم المشار يستعمل طبياً وعلى الأخص عصيره اللبني يستخدم في قتل الجنين أوراقه مغبرة كبيرة شمارة تحوى أليافاً حريرية أزهاره بيضاء والتكاثر بالبذور — ومسحوق الجذور يستعمل في الأمراض الجلدية والسعال .

Camellia Ternstroemiaceae

شجيرة صغيرة تربي عادة داخل الصوب الخشبية والصوب الزجاجية . زهرتها جميلة معروفة بيضاء أو حمراء . تستورد نباتاً لها من إيطاليا وغيرها ويصعب تكاثرها بحصر .

Campanula Campanulaceae

حولى شتوى تزرع بذوره في يونيو ويرى مزهراً في الربيع وأزهاره زرقاء أو أوقرفلية .

Canna indica Cannaceae

نبات درني كثير الانتشار في معظم الحدائق والمنتزهات — الألوان كثيرة وعلي الأخص الأصفر والأحمر — يتكاثر بواسطة تجزئة الريزومات في فبراير - تزهر في الربيع والصيف والخريف - يلاحظ زرعها في أحواض كثيرة الرطوبة وترى أحياناً منزرعة بجوار الماء - يحسن تجديده زرعها سنوياً بالتجزئة . ارتفاعها حوالى متر . وأوراقها كبيرة عريضة .

Carissa Grandiflora Apocynaceae

شجيرة شوكية أزهارها عطرية تشبه الياسمين . الثمار صغيرة أرجوانية داكنة تؤكل . التكاثر بواسطة البذور . تستعمل كسياج مانع .

Carnations — see (Dianthus)

Caryopteris Mastacanthus Verbenaceae

شجيرة غزيرة الازهار وأزهارها زرقاء بنفسجية ترى في فبراير وتقص عادة بعد التزهير والتكاثر بواسطة العقل .

Caryota Urens Leguminosae

نبات نخيل للزينة متوسط الحجم . أوراقه تشبه زعانف السمك - يحسن زرعه في الأماكن الظليلة ونوعا والتكاثر بالقلعة والبذور .

Cassia Leguminosae

أنواعها عديدة والأوراق غالباً برشبية والتكاثر بواسطة البذور ومن أنواعها (١) C. artemisoides شجيرة أوراقها خضراء مغبرة رفيعة وأزهارها

صفراء في مجاميع غزيرة ترى من يناير إلى مارس (٢) *C. Bicapsularis* شجيره
فروعها مدلاه وأزهارها صفراء لامعة تزهر معظم أوقات السنة (٣) *C. Didymobotrya*
شجيره أزهارها صفراء عنقودية تزهر معظم أوقات السنة (٤) *C. Fistula* وهي
شجره ترى مزهره صيفا أزهاراً صفراء وثمارها طويلة سوداء . وتستعمل طبيا كسهل
وتعرف باسم خيار شمير . والتكاثر بالبذور .

Casuarina equisetifolia

Casuarinaceae

شجرة خشبية تستعمل كصند للريح منتشرة في الطرق الزراعية أوراقها رفيعة
إبرية دائمة الخضرة تتكاثر بالبذور .

Catha edulis

Celastraceae

شجرة دائمة الخضرة موطنها بلاد اليمن تمضغ أوراقها ككافور تتكاثر بالبذور
وتعرف باسم « القط » أو « الكاد » وأزهارها صغيرة بيضاء .

Cattleya

Orchidaceae

جنس من نباتات الأوركيدز أنواعه عديدة وأزهاره جميلة مختلفة الشكل
والألوان مختلفة ويربي داخل الصوب الزجاجية ويحتاج إلى عناية خاصة في تربته

Cedrela

Meliaceae

شجرة خشبية تصنع منها الموبيليات الفاخرة . تتكاثر بالبذور أوراقها ريشية
ومن أنواعها *C. Toona* وأزهارها بيضاء *C. Odorata* وخشبا عطري يستعمل في
صنع علب السيجار وكذا الموبيليات وغيرها .

Celosia cristata

Amarantaceae

حولى صيفي تزور بذوره في فبراير ومارس ويزهر صيفاً وأزهاره حمراء
ويعرف باسم عرف الديك .


Cerbera odollam

شجرة جميلة دائمة الخضرة أزهارها بيضاء . تشبه الونكاذات رائحة ترى مزهرة
في الربيع والتكاثر بالعتلة .

Antirrhinum



Aster



Centaurea

Compositae

نباتات عشبية حولية أو مستديمة - (١) C. cyanus حولي شتوي عطري
تزرع بزوره في يوليو وانسطقس ويزهر في الشتاء والربيع وأزهاره زرقاء أو حمراء
أو بيضاء .

(٢) G. Cineraria عشب مستديم أوراقه بيضاء وأزهاره صفراء يستعمل
للزراعة حول أحواض الزهور .

Cephalocereus

Cactaceae

جنس من الصبار يتميز بوجود طبقة من الشعور البيضاء الكثيفة تغطي جسم
النبات . التكاثر بالخلفه والبذور .

Cerantonia Siliqua

Leguminosae

شجرة انثروب دائمة الخضرة . تستعمل للظل . وخشبها للوقود والصناعة .
تؤكل ثمارها . التكاثر بالبذور . والأزهار حمراء . الأوراق ريشية .

Cereus

Cactaceae

جنس من الصبار ساقه طويلة لحمية شوكية . وبعض أنواعه تؤكل ثمارها التكاثر
بالمقتله والخلفه

Cestrum

Solanaceae

شجيرات لاتعلو كثيرا دائمة الخضرة تزهر في كثير من أوقات السنة . ومن
أنواعها .

- | | |
|------------------|--------------|
| C . Aurantiacum | أزهاره صفراء |
| C . elegans | » حمراء |
| C . Fasciculatum | » موف |
| C . Diurnum | » بيضاء |

Chamaedorea elegans


Palmaceae

نوع من نخيل الزينة يزرع في الاماكن الظليلة ارتفاعه حوالي مترين . أوراقه
ويشبه التكاثر بالبذور

Cineraria



Celosia





Chrysanthemum

Chamaerops .

Palmaceae

جنس من نخيل الزيتة أوراقه مروحية الشكل ومنه

- ١ . Ch . excelsa قصير والاوراق كثيرة النفض
٢ . Ch Humilis تصل إلى ارتفاع ٦ أمتار

والتكاثر بالبذور

Cheiranthus

Cruciferae .

حولي شتوي تزرع بذرته في يوليو وأغسطس ويزهو في الشتاء والربيع أزهاره

صفراء

Chorisia

Bombacaceae

شجرة تزهو في الخريف أزهارها بجمية اللون متساقطة الاوراق للتكاثر بالبذور

نادرة الوجوده ومن أنواعها المشهورة Ch . Speciosa

Chrysanthemum

Compositae

يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة منها الحولي ومنها المستديم . مثال ذلك

(١) Ch . Coronarium حولي شتوي (٢) Ch . Frutescens عشب شجيري دائم

الخضرة يعرف باسم المرجريت أو المتدللية أزهاره بيضاء في الربيع وتتكاثر بالقلعة

ويصلح للزراعة في الجبلات (٣) Ch . Indicum وتعرف باسم الاراولة وتقام

لها معارض خاصة في الخريف . وأزهارها كبيرة جميلة مختلفة الالوان . وتتكاثر

بالخلف الصغيره في الشتاء وتزهو في أواسط الخريف (أواخر اكتوبر ونوفمبر)

وتربي عادة في قصارى . ويحتاج إلى عناية خاصة في تربيتها

Chrysophyllum Monopyrenum .

Sapotaceae

شجرة عصيرها لبني أوراقها نخيية نوعا ذات لون ذهبي من أسفل ثمرتها بحجم

الزيتون تؤكل وتتكاثر بالبذور

Cineraria

Compositae .

حولي شتوي غزير الازهار . وأزهاره صغيرة وألوانها عديدة جذابة . يربي


Clitoria Ternatea	Leguminosae
عشب أزهاره زرقاء يزهر في الخريف وتزرع بذرته في مارس وأبريل يصلح للزراعة في الجبلات	
Clivia Miniata	Amaryllidaceae
يدخل ضمن الأصيل الزهرية يربى عادة في الصوب التكاثر بالبذور أو التجزئة أزهاره برتقالية قومية	
Cocos	Palmaceae
نخيل للزينة <i>Romanzoffiana</i> C. وأوراقه ريشية ويتكاثر بالبذور - ومن أنواعه <i>C. Nucifera</i> نخلة جوز الهند وتوجد منها نماذج بمجزرة السردار بأسوان	
Codiaeum = Croton	Euphorbiaceae
شجيرات أوراقها زخرفية ذات ألوان مختلفة ترى منتشرة في الاسكندرية وتوجد هناك في العراء وترى في القاهرة داخل الصوب وتتكاثر بالعقلة . قيمة للغاية كشجيرات للزينة	
Coleus	Labiatae
حوليات أوراقها زخرفية تتكاثر بالبذور والعقل في مارس وأبريل وترى في قصارى داخل الصوب الخشبية .	
Cordia Myxa	Boraginaceae
الحطخ شجرة دأمة الخضرة ظليلة الخشب متوسط الصلابة متين ثماره تجلب الطوايط فيحسن عدم زراعته بجوار المساكن وهذه الثمار بها مادة سكرية لزجة تؤكل وتستهمل في صيد الطيور (الدبق) وتتكاثر بالبذور	
Convolvulus Floridus .	Convolvulaceae
شجيرة أوراقها تشبه أوراق الدفلة خضراء رمادية الأزهار بيضاء ناصعة ترى في الربيع والتكاثر بالبذور	
Cordyline	Liliaceae
نبات ورفى يشبه الدراسينا ويتكاثر بالعقلة ويزرع في الاماكن الظليلة	

عادة داخل الصوب الخشبية . تزرع على عروات من مايو إلى يوليو وموعداً زهارها مارس	
Ginnamomum Camphora	Lauraceae
شجرة الكافور ويستخرج من خشبها زيت الكافور الاصلى وهي دائمة الخضرة متوسطة الحجم تتكاثر بالبذور ويوجد نوع آخر يعرف باسم <i>C. Zeylanicum</i> شجرة القرفة ويستخرج من قلف نباتها القرفة المعروفة	
Citharexylum Quadrangulare	Verbenaceae
شجرة خشبية تستعمل أخشابها في صنع بعض الآلات الموسيقية أوراقها ذات عناق محمر . ترى أوراقها في الشتاء ذات لون نحاسي . تتساقط في أبريل ولا تلبث أن تجدد أوراقها بعدئذ . التكاثر بالعقل والبذور أزهارها بيضاء عطرية نوا .	
Clarkia elegans	Onegraceae
حولى شتوى تزرع بذوره في أغسطس وسبتمبر ويزهر في الشتاء والربيع يصل ارتفاعه إلى حوالى ٨٠ سم الأزهار قرنفلية أو أرجوانية أو محمرة . يصلح للقطف .	
Clematis Flammula	Ranunculaceae
متسلق أوراقه ريشية يزهر في الربيع أزهاره بيضاء صغيرة . يتكاثر بالبذور	
Clerodendron .	Verbenaceae
شجيرات للزينة أنواعها عديدة مثال ذلك (١) <i>C. Fa.lax</i> . أوراقها داكنة أزهارها قرمزية في مجاميع تزه معظم أوقات السنة ماعداً فصل الشتاء . تحسن زراعتها في أماكن نصف ظليلة وتتكاثر بالبذور ومعروفة باسم طربوش الملك	
<i>C. Fragrans</i> (٢) . جمالها في أزهارها البيضاء العطرية وتتكاثر بالعقلة	
<i>C. Inerme</i> (٣) . ويعرف باسم الياسمين الأزفر . دائم الخضرة الأوراق صغيرة داكنة يزرع كسياج أو كشجيرة قائمة مشكلة بالنص وأحياناً كمتسلق وأزهاره بيضاء صغيرة والتكاثر بالعقلة	


Cuph. a LLavea	Lythraceae
نبات صغير فروعه مدلاه الازهار قرمزية ترى في الشتاء والتكاثر بالتجزئة	
ويوجد نوع آخر C. miniata . يتكاثر بالبذور ويزهري في الصيف أزهارا حمراء	
Cupressus	Coniferae
«السرو» أشجار دائمة الخضرة خلافا للمنظر تتكاثر بالبذور . ومن أنواعه	
C. Macrocarpa . وفروعها أقيية وشكل الشجرة هرمي وفي بعض الاحوال تستعمل كسياج للزينة	
C. Sempervirens	C. S. Var. Pyramidalis
وكثيرا ما تستعمل كصند للريخ ومن أصنافها التي ترى منزرعة بالمداخن	
Cycas	Cycadaceae
يشبه النخيل ساقه قصيره وأوراقه ريشية داكنة يرى منزرعا بالمسطحات	
الخضراء يتكاثر بالبذور والخلفة ومن أنواعه C. Revoluta . و C. Circinalis . وهذا الأخير أوراقه أكبر نوعا وأفتح لونا	
Cyclamen .	Primulaceae
نبات درني قصير أزهاره ذات شكل خاص جميل يربي عادة داخل الصوب وتزرع درناته في أكتوبر ونوفمبر ويزهري في الربيع	
Cynodon Dactylon	Gramineae
التجيل البلدي المعروف وتزرع منه المسطحات الخضراء المستندعة المنتشرة في الحدائق بواسطة العقلة في الربيع والصيف ويرى مصفرا في الشتاء فتنتثر على مسطحاته بزور الجازون وتغطي بطبقة من السجاد	
Cynoglossum .	Borraginaceae
حولي شتوي يزرع في يوليو ولون أزهاره زرقاء	
Cyperus Papyrus	Cyperaceae
« البردي » . كان يزرع بكثرة أيام المصريين القدماء لصناعة ورق البردي للكتابة من أعناق الاوراق وهو نبات مائي يرى الآن كنبات للزينة ويوجد نوع	

Coreopsis	Compositae
حولي شتوي تزرع بذوره في الصيف ويزهري في الشتاء والربيع وأزهاره صفراء	
Corypha Australis (Livistonia)	Palmaceae
نخيل للزينة أوراقه مروحية مفضصة والتكاثر بالبذور	
Cosmos	Compositae
حولي صيفي يزهر صفيا ولون الازهار برتقالية أو قرمزية أو بيضاء تزرع بزوره في مارس	
Cotoneaster Horizontalis	Rosaceae
شجيرة كثيرة التفرع نموها في اتجاهات أقيية ترى ثمارها الحمراء الجميلة في الشتاء تصلح للزراعة في الجبلانيات وتكاثر بالبذور	
Cotyledon	Crassulaceae
نباتات عصارية تصلح للزراعة بالجبلانيات وتكاثر بالعقله .	
Crassula	Crassulaceae
يصلح للزراعة بالجبلانيات . ويدخل ضمن النباتات العصارية	
Grinum	Amaryllidaceae
نبات بصلي زهري يرى مزهرا في الربيع والصيف أبصاله كبيره . وأزهاره بيضاء غالبا أو بيضاء محمره .	
Crocus	Iridaceae
نبات بصلي زهري قصير ألوان الازهار عديده يزهر في الربيع	
Crotolaria Madurensis	Leguminosae .
شجيره سريعة النمو فروعها قائمة زهر شتاءً أزهارها صفراء تقص عادة بمد	
الزهير التكاثر بالبذور	
Croton See Codiaeum Cryptostegia Grandiflora	Asclepiadaceae .
شجيره مداده أوراقها جلدية تزهر في الصيف والحريف الازهار قرفلية باهتة مبيضة جرسية الشكل . التكاثر بالبذور وتفرز ماده لبنية	

Cyperus Papyrus



Cyperus Alternifolius



آخر أقل طولاً يعرف باسم *C. Alternifolius* . والشكائر بواسطة تقسيم النباتات القديمة .

D

Daidalacanthus Nervosus .

Acanthaceae

شجيرة أزهارها زرقاء تری في الشتاء . تقص بعد التزهير عادة والشكائر بالعقلة وتیری وسط المسطحات الخضراء .

Daffodils - See *Narcissus* .

Dahlia

Compositae

نبات درنی أزهاره كبيرة جميلة (مفرد أو مجوز) یری مزهرا في الصيف والخريف بشكائر بواسطة الجزور الدرنية التي تزرع في مارس وابریل ومايو وأبوالجزور في مارس .

Dalbergia Sissoo

Leguminosae .

السرسوع شجرة خشبية تنأثر أوراقها شتاء . تستعمل أخشابها في صنع بعض الآلات الزراعية . كثيرة الوجود تنكأثر بالجزور .

Dasyliirion

Liliaceae .

نبات قصیر الجذع أوراقه طويلة حادة رفيعة منتظمة في شكل قبی كروی . یری منزراً بالمسطحات الخضراء

Datura Arborea .

Solanaceae .

شجيره أزاهیرها كبيرة مدلاة تشبه النغير بیضاء اللون تزهیر في كثير من أوقات السنة ويوجد نوع آخر أصفر أوراقه ناعمة *D. Suaveolens* . والشكائر بالعقلة

Delphinium

Ranunculaceae .

« العایق » حولی شتوی تزرع بزوره في يوليو وأغسطس ولون أزهاره بتسجی أو عیجی أویضاً . ومن أنواعه :

D. Ajacis — D. Bella Donna — D. Formosum

Dendrocalamus Giganteus . Gramineae .

أطول أنواع الغاب بمصر " Bambusa " يصل ارتفاعه إلى حوالي ٢٠ متر
والتكاثر بواسطة الرزومات .

Dianthus Caryophyllacéae .

القرنفل . ومنه النوع الحولى الشنوي D. chinensis . ويتكاثر بالبزور في
يوليو وأغسطس ويزهق في الشتاء والربيع وأزهاره مختلفة الألوان - كذلك
D. Barbatus

والنوع المستديم مثال ذلك القرنفل الامريكاني والقرنفل البدي
D. Caryophyllus والتكاثر بواسطة العقلة في يناير وفبراير . ويزهق في الشتاء
والربيع .

Dictyosperma Palmacae .

نوع قصير من نخيل الزينة أوراقه ريشية مشربة بجمرة داكنة لانهلث أن تزول
متى كبر النبات والتكاثر بالبزور

Dieffenbachia Aroideae .

نبات يرى داخل الصوب أوراقه كبيرة وعريضة نوعا مزركشة ببعض الألوان
ويتكاثر بالعقلة .

Dimorphotheca Compositae

حولى شتوى تزدهق بزوره في الصيف ولون أزهاره بيضاء غالبا أو صفراء برتقالية
Dodonaea Viscosa . Sapindaceae .
شجيرة تصلح كسياج للزينة تتكاثر بواسطة العقل .


Dolichos Lablab Leguminosae

(لبلاب) منساق قوى يتكاثر بالبزور وأزهاره أرجوانية أو بيضاء .


Dombeya Mastersii Sterculiacae

شجيرة أوراقها قلبية ملمسها قطني الأزهار بيضاء ومشرية ملونة وردى عطرية
التكاثر بالعقلة .

Dahlia



Dahlia (Single)



Dracaena Draco

Liliaceae

نبات ورقي يري في الاماكن الظليلة أوراقه كبيرة ومتجمعة في قمة الساق يتكاثر بالعقلة وتوجد أنواع من الدراسينا أوراقها محمرة ترى داخل الصوب .

Duranta Plumeiri

Verbenaceae .

شجيرة دائمة الخضرة أزهارها في مجاميع بنفسجية فاتحة ولقموها ثمارها الصغيرة الصفراء المدلاة جمال آخر . وتستعمل كسياج للزينة كثيرة الانتشار وكثيراً ما ترى كشجيرة قائمة مشكلة بالاص حسب الرغبة والتكاثر بواسطة العقلة .

E

Echeveria

Crassulaceae

نباتات عصارية تصلح للزراعة في الجبلديات وتكاثر بالخلفة .

Echinocactus

Cactaceae

نباتات عصارية تصلح للزراعة في الجبلديات وتكاثر بالخلفة

Echinopsis

Cactaceae

نباتات عصارية تصلح للزراعة في الجبلديات وتكاثر بالخلفة

Eichhornia Crassipes .

Pontederiaceae

الياسنت المائي . نبات مائي له اجزاء مستنقحة تساعد على الطفو على الماء . الازهار بعضجية خفيفة ترى في الصيف والخريف يتكاثر طبيعيا بالاقسام .
ويوجد نوع آخر *E. azurea* ذات أوراق سهمية وازهار زرقاء سماوية يزهر من مايو إلى نوفمبر . والتكاثر بالتجزئة .

Erythrina Crista-galli

Leguminosae .


شجرة متساقطة الاوراق شتاء وازهارها قرمزية برتقالية في الربيع والتكاثر بالعقلة . وفروعها شوكية

Eschscholtzia


Papaveraceae.

حولى شتوي لون ازهاره أصفر برتقالي تزهر بدوره صيفاً

Dianthus Chinensis



Dimorphotheca



Epiphyllum .

Cactaceae .

نبات عصاري رخو ازهاره بمية زاهية بطعم عادة على نبات البرسكيا او السيريوس . يري داخل الصوب .

Eucalyptus .

Myrtaceae

أشجار الكافور . منتشره بكثرة . دأمة الخضرة . تتكاثر بسهولة بالزور وأنواعها عديدة مثال ذلك

E . Resinifera E . Citriodora E . Globulus .

E . Longifolia — E . Robusta .

والكافور من الاشجار الخشبية الظليلة

Eupatorium Riparium

Compositae

عشب شجيري ازهاره شبيه بازاهير البرجمان يزهر في الربيع في مجاميع بلون الابيض الكرم ويتكاثر بواسطة العقل .

Eugenia Jambolana .

Myrtaceae

(الجبوزا) شجرة دائمة الخضرة تؤكل ثمارها ذات اللون الاحمر الارجواني وازهارها بيضاء وتتكاثر بالزور . ومن الانواع E. micheii سياج للزينة

Euphorbia Pulcherrima

Euphorbiaceae .

بنت القنصل شجيرة جمالها في قناياتها الكبيرة الحمراء في الخريف والشتاء — تقص عادة بعد الزهر والتكاثر بالعقلة — ويوجد نوع آخر Splendens . شجيرة صغيرة سوقها شوكية . نموها أقوى ازهارها حمراء صغيرة تصلح للجبليات والتكاثر بالعقلة

Ehretia Acuminata

Bo. aginaceae

شجرة متساقطة الاوراق سريعة النمو . خشبها لين . تنجح في الاراضي المالحة تتكاثر بالسرطانات . وسطا ناتها الجندرية تقوى شواطئ الترع القابلة للانهار

Elaeagnus Hortensis

El. agnaceae

البلح الافريقي شجرة متساقطة الاوراق ازهارها عطرية . الخشب يستعمل للحريق تتكاثر بالعقلة . تنجح في الاراضي المالحة . حيث تستعمل هناك كصدمات للرياح .



Euphorbia pulcherrima

F

Ficus .

السرخسيات . نباتات ورقية عديدة الازهار . تتكاثر بواسطة الجراثيم وانواعها عديدة جدا وتربى عادة داخل الصوب وبعضها ينجح في الاماكن الظليلة بالمديسة

مثل ال Nephrolepis

Gramineae .

Festuca

نبات قصير صغير حشيشى القوام يصلح للزراعة بالجليليات . أوراقه فضية منفره

Ficus

Urticaceae

جنس يشمل عدة أنواع من الاشجار التي تحبب زراعتها بمصر نجاحا أكيدا وتتكاثر أنواع القبسك بالعقلة في مارس وابريل - وأنواعه الآتية منتشرة بكثرة في الحدائق والطرق

F . Nitida

أوراقه صغيرة دائمة الخضرة

F . Religiosa

أوراقه أكبر مستدقة رقيقة الطرف تتساقط أوراقه في ابريل

F . Elastica

أوراقه خضراء جلدية لامعة

F . Benghalensis .

يشير بوجود جذور هوائية تتدلى من الفروع

F . Ben jamina

فروعه مدلاه نوعا

F . Infectoria

أوراقه تشبه أوراق المانجو تتساقط في ابريل

F . Platiphylia

أوراقه كبيرة . فقا لشجرة كروية نوعا

F . Carica

التين البرشومي المعروف

F . Sycamorus

الجيز المصرى المشهور

Fittonia

Acanthaceae .

نباتات صغيرة أوراقها زخرفية مشربة باللون الأبيض النضى او اللون المحمر ترى عادة داخل الصوب .

Freesia

Iridaceae .

نبات بصلي زهرى عطرى للغاية . قصير . تزرع أبصا له فى القصارى وفى الاحواض فى اكتوبر ونوفمبر ويظهر فى الربيع ولون الزهرة أبيض أو أصفر أو أرجوانى .

Furcraea

Amryllidaceae .

نبات عصارى يشبه الاجاف اوراقه جلدية ذات لون أصفر . يرى وسط المسطحات الخضراء . التكاثر بالقلعة .

G

Gaillardia

Compositae

«عنب كشمير» حولى شتوى لون ازهاره صفراء أو برتقالية أو حمراء قمرزية تزرع بنوره فى يوليو

Gardenia

Rubiaceae .

شجيرة ازهارها بيضاء عطرية تشبه الفل وتكاثر بواسطة العقل وأوراقها داكنة لامعة

Gasteria

Liliaceae

نبات عصارى يشبه الصبار . صغير أوراقه لحمية مرقطة . يرى منزرعا بالجليليات

Gaura

Onagraceae .

حولى ازهاره بيضاء أو وردية يرى مزهرا فى الشتاء وتزرع بزور فى الصيف

Gazania

Compositae .

عشب مداد أوراقه من أسفل بيضاء زغبية . أزهاره صفراء برتقالية يتكاثر بسهولة بالعقلة . يزهر فى كثير من أوقات السنة منتشر فى نواحي الاسكندرية .

Genista Monosperma .

Leguminosae .

شجيرة فروعها رشيقة رمادية أوراقها خيطية أزهارها بيضاء عطرية فى مجاميع ترى فى فبراير ومارس تنجح فى الاراضى الرملية . التكاثر بالبزور .

Geranium = See Pelargonium

Geraniaceae .

الجارونيا أعشاب مستديمة أوراقها تشبه الخبيزة . تتكاثر بالعقلة . وأزهارها حمراء أو بيجي أو بيضاء الخ ويحسن تجديده زراعتها سنويا بالأحواض - ومن

الجارونيا نوع مداد يعرف باسم « جارونيا لبر ». والجارونيا تزهر في أكثر أوقات السنة. والأشواك المشهورة لالجارونيا هي :

Pelargonium Zonale

الجارونيا المنتشرة

P . Odoratissimum

المطرشان أوراقه عطرية

P . Peltatum

الجارونيا المدادة

P . Domesticum

الجارونيا الأنجليزى تزهر في مارس وأبريل

Gerbera Jansoni

Compositae

عشب. يستديم يزهر في كثير من أوقات السنة وعلى الأخص في مارس ويتكاثر بالبزور من مارس إلى يونيو وأزهاره برتقالية أو قرمزية الخ .

Geum

Rosaceae .

حولى شتوى تزهر بزوره في أغسطس وأزهاره برتقالية أو قرمزية .

Gilia

Polemoniaceae .

حولى شتوى تزهر بزوره في يوليو وأزهاره بيضاء أو بنفسجية أو زرقاء .

Glaucifolius

Iridaceae .

نبات بصلى زهرى يتكاثر بالكورمات التي تزهر خلال ديسمبر إلى فبراير ويزهر في الربيع وبعض الصيف. أوراقه تشبه السيف وأزهاره جالسة بوقية ويصلح للقطف والألوان الأزهار بيضاء أو حمراء أو صفراء الخ .

Gleditschia Triacanthos

Leguminosae

شجيرة شوكية متساقطة الاوراق تصلح للزراعة في الأراضي المالحة تتكاثر بالبزور . بطيئة النمو .

Gloxinia


Gesneriaceae .

نبات درنى يرى داخل الصوب يتكاثر بالبزور والدرنات وأزهاره كبيرة على جمال عظيم قطعية المس . يرى مزهراً في الربيع .

Gasleria



Haworthia



جنوده الهوائية لاقية لأزهاره تكسى بها الحوائط وجزوع التخيل . دائم الخضرة
يتكاثر بالتراقد .

Hedychium Coronarium

Scitamineaceae

نبات أوراقه متطاولة يزوع بجوز الماء . أو في أرض رطبة أزهاره بيضاء عطرية
للغاية في فصل الخريف . التكاثر بواسطة التجزئة ومن أنواع الهديكويم الفاخرة .
H. Gardnerianum . وزهرته صفراء

Helianthus Annuus

Compositae

عباد الشمس - حولي صيفي تزوع بذوره في مارس ويزهر أزهاراً كبيرة صفراء

Helichrysum

Compositae

حولى شتوي تزوع بذوره في يوليو وأغسطس وأنوان أزهاره عديدة ويتميز
بجفاف بتلات أزهاره .

Heliotropium Peruvianum

Boraginaceae

عشب يزهر شتاء ولون ازهاره زرقاء أو بيضاء . تزوع بذوره في أغسطس .

Hemerocallis

Liliaceae

نبات بصلي حشيشي القوام يزهر صيفياً من أبريل إلى يونيو والتكاثر بالتجزئة
في الشتاء ومن أنواعه *H. Flava* . وزهرته صفراء لميوني و *H. Fulva* . وزهرته
برتقالية

Hibiscus Rosa - sinensis

Malvaceae

شجيرة ازهارها حمراء جميلة تتكاثر بواسطة العقل . وهي من الشجيرات
الدائمة الخضرة وتصاب بشدة بالبق الدقيق

Hoya Carnosa

Asclepiadeae .

متسلق ازهاره بيضاء شمعية للمس يتكاثر بواسطة العقل . يرى داخل الصوب
وفي الاماكن الظليله .

Gonelia

Onagraceae .

حولى شتوي أزهاره حمرة غالباً وعلى جمال عظيم تزوع بذوره في يوليو وأغسطس

Grevillea Robusta

Proteaceae .

شجرة البلوط الحيري . خشبها مرين ومتين للغاية . أزهارها برتقالية تتكاثر
بالزور - ومن أنواع الجريفيليا *G. Preissii* . وهي شجيرة أوراقها ريشية خيطية
تزه في كثير من أوقات السنة أزهاراً حمرة قو نغلية وتكاثر بالعقل .

Gomphrena

Amaranthaceae .

حولى صيفي أزهاره بيضاء أو أرجوانية تزوع بذوره في فبراير ومارس .

Gynerium Argenteum

Gramineae .

حشيش من حشائش الزينة يتكاثر بالتجزئة وجماله في ثورته الريشية البيضاء
الجميلة . يصلح للزراعة في المسطحات الخضراء على أفراد .

Gypsophil

Caryophyllaceae .

حولى شتوي أزهاره بيضاء صغيرة ريشية ترين بها الموائد تزوع بذوره في
يوليو وأغسطس .

H

Harpephyllum Coffrum

Anacardiaceae

شجرة دأمة الخضرة قليلة خشبها متين ثمارها في حجم الزيتون الكبيرة .
تتكاثر بالزور .

Haworthia

Liliaceae

نبات يشبه الصبار صغير مرقط يصلح للزراعة بالجلاليات يتكاثر بالخلفة .

Hedera Helix

Araliaceae .

« حبل المساكين » متسلق أوراقه صغيرة داكنة الخضرة يستند ويتسلق بواسطة

Hunnemannia Papaveraceae

حولى شتوى أزهاره ليمونى تزرع بزوره فى يوليو وأغسطس

Hyacinthus Liliaceae

« الياست » . نبات بصلى تستورد أبصاله من الخارج وتزرع فى قصارى داخل للصبوب الخشبية ونورته اسطوانية بيضاء أو بنفسجية أو عجمية عطرية للغاية . ميعاد الزراعة أكتوبر ونوفبر والتزهير فى اوائل الربيع

Hydrangea hortensis Saxifragaceae

عشب الزينة يربي فى قصارى داخل الصوب الزجاجية ازهاره بيضاء أو عجمية . يتكاثر بالعقل محتاج الى عناية خاصة

Hyophorbe Verschaaffeltii Palmaceae

نخيل للزينة لا يعلو كثيرا يرى داخل الصوب أوراقه ريشية

Hypericum Floribundum Hypericaceae .

شجيرة فروعها تنهى بمجاميع من ازهار صفراء ترى فى الربيع والتكاثر بالبذور

Hyphaene Thebaica Palmaceae

« البوم » يوجد فى مصر العليا . وله نموذج بحديقة الازبكية وخشبه يستعمل فى عمل الموارض المائية وبزوره تعمل منها زراير بالسودان . ساقه متفرعه أوراقه مروحية . يتكاثر بالبذور

Haematoxylon Cambuchianum Leguminosae .

شجرة البقم مستديمة الخضرة ادخلت من الهند العربية وهى تكون سياجا شوكميا متينا وتتكاثر بالبذور .

I

Iberis Cruciferae .

حولى شتوى قصير أزهاره بيضاء تزرع بزوره فى يوليو وأغسطس .

Impatiens Balsamina Geraniaceae .

حولى صيفى أزهاره بيضاء أو قرمزية أو وردية تزرع بزوره فى فبراير ومارس .



Impatiens Balsamina

Bona -Nox

منسلق - يتكاثر بالبذور . وأزهاره بيضاء .

Iris

Iridaceae .

أبصال زهرية . أزهارها جميلة جذابة . أنواعها عديدة بعضها يتكاثر بواسطة الرزومات مثل Germanica . وبعضها يتكاثر بواسطة الأبصال مثل Dutch Iris . وأزهاره صفراء . أو بنفسجية أو بيضاء . وموعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر وموعد التزهير الربيع .

J

Jacaranda

Mimosaeolia

Bignoniaceae

شجرة متساقطة الاوراق تزهـر بغزارة في ابريل ومايو أزهاراً بنفسجية جميلة . والاوراق ريشية والتكاثر بالبذور . وهي في مقدمة أشجار الزينة جمالا .

Jacobina

Acanthaceae .

نبات لا يعلو كثيراً . أزهاره محمرة . يشاهد في الصوب وفي الأماكن الظليلة والتكاثر بالعقلة .

Jasminum

Oleaceae .

الياسمين . وأنواعه عديدة مثال ذلك : الياسمين البلدي المعروف وأوراقه ريشية J . Grandiflorum . ويـزهـر معظم أوقات السنة أزهاراً بيضاء عطرية . ويعتبر من الشجيرات المدادة والتكاثر بالعقلة والتراقيد .

J . humile

شجيرة مدادة نوعاً أزهارها صفراء في الربيع . والتكاثر بواسطة التراقيد .

J . Primulinum

أزهاره صفراء .

J . Azoricum

أزهاره بيضاء .

J . Pubescens

أزهاره بيضاء .

J . Sambac

الفل المحجوز وأزهاره بيضاء . ويتكاثر بالتراقيد .

Indigofera Pulchella .

Leguminosae .

شجيرة أوراقها ريشية أزهاره تشبه البسلة أرجوانية اللون تزهـر في فبراير ومارس وتكاثر بالبذور .

Inga Dulcis

Leguminosae

شجيرة قليلة أوراقها ريشية أزهارها بيضاء . قرونها (ثمارها) سكرية . تتكاثر بالبذور .

Lochroma

Solanaceae

شجيرات تزهـر معظم أوقات السنة ذات مجاميع زهرية مدلاة أنبوية تتكاثرها بواسطة العقل ومن أنواعها :

I. Coccineum

قمرزية

I. Tubulosum

زرقاء داكنة

Ipomoea .

Convolvulaceae

أنواعها عديدة مثال ذلك . .

Ipomoea . Quamoelit . التكاثر بالبذور

I. rubra coerulea . متسلق حولي أزهاره زرقاء سايوى التكاثر بالبذور

I. carnea . شجيرة فروعها مدلاة الازهار قرظلية باهتة

وتقص بعد التزهـر والتكاثر بالعقلة والبرور وموعد التزهـر الخريف .

I . Horsfalliae

متسلق . يزهـر شتاء أزهاراً حمراء ثانية يتكاثر بالتراقيد

I . Palmata

« ست الحسن » . متسلق يزهـر في كثير من أوقات السنة . أزهاره بنفسجية محمرة باهتة التكاثر بالتراقيد .

I . Leerii

متسلق يزهـر في كثير من أوقات السنة . أزهاره زرقاء التكاثر بواسطة التراقيد

Kigelia pinnata

Bignoniaceae

شجرة الخيار أو «المشطورة» — شجرة أوراقها ريشية خشنة الملمس . أزهارها
جفراء داكنة على حوامل مدلاة وثمارها أشبه باللوف مدلاة باعناق حبلية وتستعمل
طبيا للسعال . تتكاثر بالبذور — وخشبها صلب

L

Lagerstroemia Indica

Lythraceae

« التمرحنا الافرنكي » شجيرة متساقطة الاوراق شتاء زهر صيفا أزهارا
صغيرة قرنقالية في مجاميع وتتكاثر بالمعقلة والبزور

Lagunaria Patersonii

Malvaceae

« بودرة العفريت » شجرة أوراقها بسيطة رمادية من أسفل أزهارها قرنفلية
بمبية تتكاثر بالبذور تصلح للاراضى المالحة خشبها أبيض متين ثمارها عند فتحها
ينشر منها زعب شوكي لداع للجلد

Lantana Camara

Verbenaceae

« اللانتانا » شجيرة سوقها زغبية أوراقها خشنة الملمس نوعا دائما الخضره
ازهارها في نورات كروية صغيرة بيضاء أو صفراء أو برتقالى أو تجمع عدة الوان
التكاثر بالمعقلة تزرع كسباج للزينة

ومن أنواعها *L. Delicatissima* . وهى شجيرة زاحفة أوراقها أصفر تصلح
لزراعة بالجليليات ازهارها بنفسجية وردية — وكذلك *L. Salvifolia* شجيرة صغيرة
قائمة نوعا تصلح كسباج قصير أوراقها تشبه السابقة ازهارها لوونها موف

L'ania Bourbonica

Palmaceae

نخيل للزينة تزين به الابهاء وهى صغيرة منتشرة تتكاثر بالبذور أوراقها مروحية
كبيرة .

Jatropha Multifida

Euphorbiaceae

شجيرة أوراقها تفصيصها كثير غائر . أزهارها محمرة قرمزية . التكاثر بالمعقلة

Juglans Regia

Juglandaceae

شجرة الجوز — متساقطة الأوراق شتاء — ونموها بمصر لا بأس به وتتكاثر
بالبزور .

Juniperus

(Coniterae)

العمر . شجيرات وأشجار ذات شكل هرمى فى الغالب تزرع للزينة لاعتدال
قوامها — أوراقها إبرية ضيقة — التكاثر بالبذور

K

Ka'anchoe

Crassulaceae

نبات عصارى يزرع بالجليليات . وأوراقه لحمية . لا يعلو كثيرا . يتكاثر بالخلقة
كثير الشبه بالودنة

Keratia

Palmaceae

نخيل للزينة . تزين به الابهاء وغرف الاستقبال . أوراقه ريشية جميل للغاية .
يتكاثر بالبذور . وثمره مرتفع نوعا

Kleinia

Compositae

عشب يشبه الى عالم أوراقه أسطوانية لحمية ذات لون رمادى يصلح للزراعة
بالجليليات . يتكاثر بالمعقلة

Kniphofia Aloides

Liliaceae

نبات يصل يتكاثر بالنتجزة فى الخريف ويرى مزهرا فى الصيف ازهاره جالسة
على حامل طويل العلوية منها محمرة والسفلية مائلة الى اللون الاصفر

Kochia

Ghenopodiaceae

حولى صيفى تزرع بزوره فى فبراير ومارس . وقيمته فى قوامه البيضاوى لاني
ازهاره .

L. auratum الزهرة بيضاء مصفرة ذات قطف أرجوانية
L. Longiflorum الزهرة بيضاء ناصعة متطاولة

Linaria Scrophulariaceae

حولى شتوى ألوان الأزهار عديدة . يزرع بزوره فى يوليو وأغسطس

Linum Grandiflorum Linaceae .

« كتان زهور » . حولى شتوى الأزهار محمرة أو قرمزية غالباً . يزرع بزوره فى يوليو وأغسطس

Lippia Nodiflora . Verbenaceae .

« الليبيا » . عشب زاحف يصلح لعمل المسطحات الخضراء المستديمة . يتكاثر بالقلعة فى مارس وابريل ومايو . وتتأثر مسطحاته شتاء . وترى نضرة بالعمق عدا ذلك

Livistona = Latania Campanulaceae
Lobelia

حولى شتوى قصير أزهاره زرقاء يزرع بزوره فى يوليو وأغسطس

Lonicera Caprifoliaceae

« شبر فأيد » : متسلق من أنواعه المعروفة :

L. Japonica . متسلق دائم الخضرة يتكاثر بالترقيد أزهاره بيضاء مصفرة عطرية للغاية . يزهر فى مايو إلى اكتوبر L. Sempervirens . أزهاره قرمزية عديدة الرائحة تزهر فى الربيع والصيف

Laurus Nobilis Lauraceae

« الغار » شجرة دائمة الخضرة أوراقها داكنة الخضرة : تقص بأشكال مختلفة للتكاثر بالقلعة

Lathyrus Odoratus Leguminosae

بصلة الزهور . حولى شتوى يحتاج إلى دعلمات من الغاب يتسلق عليها . يزرع بزوره فى سبتمبر واکتوبر ويزهر فى فبراير ومارس أزهار ألوانها عديدة عطرية للغاية

Levandula Abrotanoides Labiatae

عشب شجيرى أوراقه عطرية أزهاره زرقاء . ويتكاثر بالبذور ويصلح للزراعة فى الجباليات . ويوجد نوع آخر المعروف باسم « اللوندنة الأصلية أو الخزامى »

L. Vera Compositae
Layia Elegans

حولى شتوى يزرع بزوره فى يوليو وأغسطس ولون أزهاره صفراء

Lawsonia Alba Lythraceae

« حناء » شجيرة أزهارها بيضاء سمنية عطرية فى الربيع والخريف تستخرج من أوراقها صبغة الحناء . التكاثر بواسطة العقل

Leptosyne Compositae

حولى شتوى يزرع بزوره فى أغسطس وأزهاره كبيرة صفراء

Ligustrum Ovalifolium Oleaceae

شجيرة صغيرة أوراقها لامعة صميرة داكنة تصلح للزينة تتكاثر بواسطة العقل ومن أنواعها L. Lucidum . وهى شجرة دائمة الخضرة . فروعها منتشرة نوعاً إلاوراق لامعة . والتكاثر بالقلعة

Lilium Liliaceae .

« الوسن » نبات يصلى أزهاره بيضاء كبيرة يزرع أبصالة فى الخريف ويزهر فى الربيع وأزهاره عديدة مثال ذلك

Lupinus

Leguminosae

«ترمس زهور» حولى شتوى ألوان أزهاره عديدة . تزرع بزوره فى يوليو وأغسطس .

Lycium Arabicum

Solanaceae

«العوسج» : شجيرة صغيرة شوكية أوراقها صغيرة . تنمو على الرمال وتقوم جذورها بتثبيتها فى أما كنها .

M

Maclura Aurantiaca

Urticaceae .

شجيرة متوسطة الحجم منساقطة الأوراق كثيرة الشبة بالتوت البرى وتتكاثر بالعقل والبزور وتزرع للظل أو كساج .

Magnolia Grandiflora

Magnoliaceae.

المانوليا . شجرة معروفة أزهارها بيضاء كبيرة عطرية أوراقها لامعة . تتكاثر بالبزور . مستديمة الخضرة .

Machaerium Tipii

Leguminosae

«أبو المسكارم» شجرة أوراقها ريشية دائمة الخضرة وأزهارها صفراء . سريعة النمو ظلية . تتكاثر بالبزور - وفى الارجتين يعتبر خشبها من أهم الأخشاب التى يتجر فيها . تزهى فى الربيع

Mammillaria

Cactaceae .

نبات عصارى صغيرة ذات حلقات منتهية بأشواك . يتكاثر بالخلفة ويصلح للزراعة بالبيلايات .

Maranta


Scitamiaceae

جماله فى أوراقه المزخرفة البديعة يرى داخل الصوب الزجاجية

Echinocactus



Mammillaria



Mignonette = Reseda Odorata

Mimosa Pudica

Leguminosae

« الست المستحقة » تزرع بقصد مشاهدة حساسية أوراقها المركبة الريشية التي تنطبق عند اللمس وعندئذ تمود فتنفرد والأزهار بنفسجية والتكاثر بالبذور .

Mimulus

Scrophulariaceae

حولى شتوى أزهاره مزركشة تزرع بزوره في سبتمبر .

Mina Lobata

Convolvulaceae

مداد يزهر صيفاً لون أزهاره وردية قرصية مصفرة ويتكاثر بالبذور .

Mirabilis Jalapa

Nyctaginaceae

« شب الليل » . عشب تفتح أزهاره ليلاً وتتكشف نهاراً . أزهاره حمراء أو بيضاء أو صفراء ثمرته سوداء مستديرة صلبة ويتكاثر بالبذور .

Momordica

Cucurbitaceae

منسلق منه النوع المعروف باسم M. Balsamina . وأزهاره صفراء والنوع الأخر M. Cochinchinensis . وأوراقه ذات ثلاث فصوص والأزهار صفراء باهتة ذات عين أرجوانية والثمرة متطاولة حمراء لامعة .

Monstera Deliciosa .

Aroideae .

« قشطة دندم » منسلق أوراقه كبيرة مثقبة . يميل إلى الزراعة في الأماكن الرطبة والنصف ظلية - الثمرة صلبة مخروطة تؤكل - ولهذا النبات جزور هوائية . ويتكاثر بواسطة العقل .

Morus

Moraceae

التوت . من الأشجار الظليلة وخشبه أصفر متين يستعمل في المبانى والموبيليات والآلات الزراعية . ويتكاثر من العقل والبذور أو بالتطعيم على أصول من التوت البلدى .

Matthiola Incana

Cruciferae .

« المتور » حولى شتوى . أزهاره بيضاء أو بيجية أو بنفسجية الخ .

مفرد أو مجوز . الرائحة عطرية . تزرع بزوره في يوليو وأغسطس .

Maurandia Barclayana

Scrophulariaceae

نبات مداد رخو ترى أزهاره في الربيع والصفيف أزهاره ناقوسية الشكل ذات لون أرجواني بنفسجي ويتكاثر بالبذور .

Melia Azadirach

Meliaceae

« الزيزنلت » شجرة منساقطة الأوراق موطنها الهند ويتكاثر بالبذور وخشبه متين ثقيل لونه أبيض مجمر والأزهار بنفسجي فاتح ويوجد نوع آخر من المليا يعرف باسم M. Sempervirens وهي عبارة عن شجيرة صغيرة تزهّر أزهاراً ألوانها بنفسجي خفيف وعطرية نوعاً وأوراقها ريشية وتتكاثر بالبذور .

Melianthus Major .

Sapindaceae

شجيرة أوراقها عميقة التنفص أزهارها أحمر بني تزرع لجمال أوراقها والتكاثر بالبذور .

Melaleuca Ericifolia

Myrtaceae

شجيرة أوراقها رقيقة إبرية صغيرة تزهّر في الربيع أزهاراً بيضاء شمعية شمبية بالفرش التي تنظف الزجاجات وأحياناً تستعمل كسجاج للزينة وتتكاثر بالبذور

Melocactus

Cactaceae

عصاة القاضى . نبات عصارى كروى يصلح بالزراعة بالجليلات والتكاثر بالخلفة .

Mesembryanthemum

Ficoideae

« الحى علم » . أنواعه عديدة جداً . وهي عبارة عن أعشاب مدادة أوراقها عصارية لحمية والتكاثر بواسطة العقلة ويصلح للزراعة بالجليلات وكثيراً ما تغطى به المنحدرات وألوان الأزهار عديدة من ذلك اللون البهجي والأبيض والأصفر الخ...

N

- Nandina domestica* Berberidaceae .
شجيرة بطيئة النمو : الاوراق صغيرة ضاربة للحمرة أزهارها طرفية بيضاء . ثمارها غنية لامية قرمزية تصلح للزراعة في الدوائر .
- Narcissus* Amaryllidaceae .
« النرجس » : وأنواعه كثيرة جداً . والازهار إما صغيرة أو كبيرة صفراء أو بيضاء مصفرة . ومن أنواعه المعروفة النرجس البليدى *N . Tazetta* . وزهره صغيرة نوعا والرائحة عطرية — ومن أنواع النرجس المعروف باسم *Daffodils King Altred* . وزهره صفراء كبيرة جميلة وتزرع أنواع النرجس في الخريف وتزهو في الربيع .
- Nasturtium = Tropaeolum* Cruciferae
« أبو خنجر » — حولى شتوى أزهاره صفراء أو برتقالية . تزرع بزوره في الارض مباشرة في شهر سبتمبر .
- Nelumbium Speciosum* Nymphaeaceae .
نبات مائى أوراقه كبيرة تعلق سطح الماء . أزهاره بيضاء كبيرة يتكاثر بالبزور . وترى أوراقه ذابلة في الشتاء .
- Nemesia* Scrophulariaceae
حولى شتوى أزهاره رشيقة مختلفة الألوان تزرع بزوره في سبتمبر
- Nemophila* Hydrophyllaceae .
حولى شتوى أزهاره بيضاء أو زرقاء أو أرجوانية ، قصير تزرع بزوره في أغسطس
- Nephrolepis* Filices
نوع من السرخسيات تنجح زراعته تحت ظلال الأشجار بينما ترى معظم السرخسيات لابد من تربيتها داخل الصوب بمصر .

- Monbretia* Iridaceae
نبات بصلى ارتفاعه حوالى متر أو أقل أوراقه تشبه السيف . أزهاره برتقالية قرمزية انبوية منحنية يتكاثر بالكورمات في الخريف وموعد أزهاره الربيع .
- Moringa apte* Moringaceae.
« حب البان » أو « الحبة انغالية » شجيرة يستخرج من بذورها زيت لتزيت الماكينات الدقيقة كالساعات وتمتد السيدات ان البزور تسمن . والتكاثر بواسطة البذور
- Muehlenbeckia* Polygonaceae
شجيرة صغيرة تزرع كنبات ورقى للزينة . وتتكاثر بالعقلة .
- Murraya Exotica* Rutaceae
شجيرة أوراقها يشبه خضراء داكنة لامعة أزهارها بيضاء صغيرة دائمة الخضرة تزرع أحيانا كسياح للزينة أو ضمن مشجرة وتتكاثر بالبزور .
- Montanoa Grandiflora* Compositae
شجيرة أوراقها مفضضة تزهو شتاء أزهاراً بيضاء . وتقرط عادة بعد الازهار والتكاثر بالعقلة .
- Muscari Comosum* Liliaceae
نبات بصلى أزهاره زرقاء صغيرة شبه كلسيه منحنية الى أسفل . زهر في الربيع . وموعد الزراعة نوفمبر .
- Myosotis* Boraginaceae
حولى شتوى تزرع بزوره في سبتمبر أزهاره صغيرة زرقاء .
- Myrtus Communis* Myrtaceae
« الآس » . « المرسين » . شجيرة أوراقها صغيرة عطرية أزهارها بيضاء مشربه بعض الحمرة . ثمارها بيضاء تؤكل . تزرع أحيانا كسياح للزينة .

Nerium oleander

Apocynaceae .

« النعلة » شجيرة دائمة الخضرة أزهارها عمرة أو بيضاء تزهر في مايو إلى

نوفمبر وتتكاثر بالقطعة

Nicotiana

Solanaceae .

دخان زهور : حولي شتوي أزهاره بيضاء أو قرمزية تزرع بزوره في سبتمبر

Nicotiana glauca

Solanaceae

شجيرة صغيرة رخوة الفروع تزهر معظم أوقات السنة . أزهاراً بنفسجية فاتحة

ذات عتق مصفر . التكاثر بالبزور

Nigella

Ranunculaceae.

حولى شتوي أزهاره زرقاء تزرع بزوره في أغسطس

Nolina recurvata = *Beaucarnea*

Liliaceae .

شجيرة لائتله كثيراً الساق سميكة بيضية عند القاعدة تشبه الزجاجة ، الأوراق

طويلة عديدة متجمعة . دلاء في نهاية الساق

Nymphaea

Nymphaeaceae .

« البشتين » نبات مائي كانت له أهمية عظيمة بمصر في الزمن القديم ، ومن

أنواعه *N. coerulea* الأزرق *N. Lotus* . الأبيض *N. Zanzibariensis* . N . وألوانه

عديدة ، والبشتين الأبيض تنفتح أزهاره ليلا وتنطبق نهاراً وأوراقه مستديرة طافية

فوق سطح الماء ، والتكاثر بواسطة البزور أو التجزئة

0

Oenothera Drummondii

Onagraceae.


عشب أوراقه مسننة يزهر أزهاراً صفراء في الصيف والخريف وتتكاثر بالبزور

في الربيع

Opuntia

Cactaceae .

نباتات عصارية سوتها متورقة - بيضاوية - أو أسطوانية شوكية أزهارها جميلة



Nelumbium



Nymphaeae

وعلى ذكرى أبو النوم فإن النوع الذى يستخرج منه الأفيون يعرف باسم

P. Somniferum

Pansy = Viola tricolor

Violaceae .

« بانسيه » حولى شتوى أزهاره جميلة مختلفة الألوان تزدهر بذوره فى أغسطس

Parkinsonia Aculeata

Leguminosae .

شجيرة شوكية منتشرة بالمهات الرملية الأوراق ريشية والفروع مدلاه .
والأزهار صفراء فى الربيع، والتكاثر بالبذور

Passiflora .

Passifloraceae :

نباتات متسلقة أنواعها عديدة مثال ذلك :

P. Quadrangularis متسلق قرى أوراقه كبيرة بيضية أزهاره عطرية
جامعة للون البنفسجى والأحمر والأبيض يزهر شتاء . والتكاثر بالعقله

متسلق متوسط النمو أوراقه ذات فصوص P. Violacea أزهاره جامعة
للون البنفسجى الفاتح والقرنفل والأبيض يزهر فى الربيع والصيف والتكاثر بالعقله

ومن أنواع الباسيفلورا P. edulis وتُأكل

P. largonium = See Geranium

هو الاسم الشائع للجارونيا الأنجيزى التى زهر مرة واحدة فى السنة (مارس
وأبريل) وتتكاثر بالعقله وتربى النباتات فى قصارى وتحتاج إلى تناية خاصة واللون
الأزهار جميلة عديدة وتعرف باسم P. Domesticum

Peltopherum Africanum

Leguminosae .

شجيرة كبيرة سريعة النمو أوراقها تشبه الجاروندا أزهارها صفراء عطرية تزهر
فى أواخر الصيف - يبنى الأكتار منها - تتكاثر بالبذور .

صفراء أو برتقالية أو حمراء ، ومن أنواعها المروقة التين الشوكى
O. Ficus indica . وكثيرا ما يرى بعض الجبلات ونوع منها ممتاز يعرف
باسم O. Tunicata . والتكاثر بالعقله

Oreodoxa Regia

Palmaceae .

« النخل المسمى » - تحمى الزيتة جميل للغاية - الساق بيضاء جذابة الأوراق
ريشية - التكاثر بالبذور - يكسب الخدقة عظمة وجمالا

Oreopanax Guatemalensis

Araceae .

شجرة أوراقها بيضة لامعة من أعلى باهتة من أسفل جلدية نوعا تتكاثر
بواسطة العقل

Oxalis

Geraniaceae

عشب أوراقه تشبه البرسيم يزهر فى الخريف والربيع أزهارها صفراء O. Cerua
أو وردية O. Floribunda . تتكاثر بالمتجزئة

P

Pauciatium Maritimum

Amaryllidaceae .

نبات بصلي يزهر صيفا أوراقه خضراء رمادية وأزهاره بيضاء

Pandanus

Pandanaceae .

يتميز هذا النبات بترتيب أوراقه ترتيبا حلزونيا ، وأوراقه طويلة شوكية ولهذا
النبات جذور هوائية دامية :

ومن أنواعه : P. Spiralis & P. Utilis

Papaver Rhoeas

Papav. raceae .

« أبو النوم زهور » حولى شتوى أزهاره محمرة تزدهر بزوره فى الصيف

عن حوالى قدم ويعرف باسم *P. Roehlenii*

Phyllanthus Reticulatus

Euphorbiaceae.

شجيرة مدادة نوعا دائما المخضرة أوراقها ريشية أزهارها صفيرة ويوجد نوع آخر
P. A'ropurpureus أوراقه صغيرة مزركشة بالوان حمراء وبني وصفراء يصلح
للقص والتشكيل ويزرع أحيانا كسياج للزينة والتكاثر بالمقلّة

Phyllocactus

Caetaceae

نبات عصارى ساقه مورقة يصلح للزراعة في الجباليات والتكاثر بالمقلّة .

Pimenta Acris

Myrtaceae

شجرة أوراقها عطرية للغاية ويستخرج منها نوع من الزيت . وتعرف باسم
شجرة الترفة . وتكاثر بالبذور قليلة الانتشار .

Pinus

Coniferae

« الصنوبر » انواعه عديدة ويتكاثر بالبذور . شال ذلك الصنوبر الحلبي
P. Halepensis الذى تنجح زراعته في الاراضى الرملية وخشبه متين - كذلك
P. Pinea وأشجاره أطول من الصنوبر الحلبي والجذع عادة يكون عاريا من
الافرع لعلو يذكر وعلى قمته رأس عريضة منبسطة يعطى للشجرة منظرا بديعا ومن
الانواع التى بمصر *P. Canariensis* & *P. Longifolia*

Pistia Stratiotes

Aroideae

« خس الماء » نبات مائى قريب للشبه من الخس يرى طافيا فوق سطح الماء .
لا ينبتى ترکه . وشأنه في الترع والمصارف لانه عشب خبيث شريم التكاثر بالانقسام

Pittosporum tobira

pittosporiaceae .

شجيرة دائمة الخضرة أوراقها خضراء داكنة أزهارها بيضاء عطرية في الربيع
تصلح للزراعة كسياج للزينة وعلى الاخص في الاماكن الظليله - التكاثر بالمقل الطرفية

Pentstemon

Scrophulariaceae

حوالى شتوى . أزهاره مختلفة الالوان تزرع بزوره في أغسطس .

Pereskia Aculeata

Cactaceae

نبات عصارى شوكى يتكاثر بالمقله يصلح للزراعة في الجباليات ويصلح كأصل
لتعليم نبات *Epiphyllum* عليه .

P. tunia

Solanaceae .

حوالى شتوى أزهاره مختلفة الالوان تزرع بذوره في يوليو وأغسطس .

Phacelia

Hydrophyllaceae

حوالى شتوى . أزهاره زرقاء خفيفة أوموف . تزرع بزوره في سبتمبر

Phalangium

Liliaceae .

حشيش للزينة أوراقه مسرية يرى داخل الصوب الخشبية ومحت للال الاشجار
يتكاثر بالتجزئة (بالخلفنة)

Philodendron

Aroideae .

نبات ورقي منسلق يرى داخل الصوب . أوراقه كبيرة تشبه السهم متطاولة

Phlox Drummondü

Polemoniaceae

حوالى شتوى قصير ازهاره بيضاء أو حمراء أو بنفسجية تزرع بزوره في يوليو

Phoenix Canariensis

palmaceae .

نخيل للزينة ساقه صميكة . الاوراق ريشية يتكاثر بالبذور يرى وسط المطحات
الحضراء ومن انواع الفنسكس *S. Dactylifera* نخيل البلخ المعروف
وكذلك النوع القصير الصغير الجميل الذى لا يزيد طول أوراقه الريشية

Pleioygnium Solandri

Anacardiaceae

شجرة متوسطة النمو أوراقها ريشية - ظليله خشبية ثمارها تشبه البرقوق .
تتكاثر بالبذور . قليلة الانتشار خشبها صلب

Platanus orientalis

Platanaceae

« الشنار » شجرة ساقها أبيض . أوراقها قلبية الشكل بوراق العنب - تتساقط
الأوراق شتاء . والتكاثر بالعقلة وخشب الشنار مصفر قليل المتانة

Plumbago Capensis

Plumbaginaceae

« بلباؤ » شجيرة رخوة الافرع دائمة الخضرة تزهر معظم أوقات السنة أزهارا
زرقاء خفيفة وتكاثر بالعقلة

Plumeria

Apocynaceae

« الياصين الهندى » شجرة متساقطة الاوراق شتاء أزهارها بيضاء عطرية
في الربيع والصيف P . Acutifolia أو جراء P . rubra - والتكاثر بالعقلة

Poinciana Regia

Leguminosae

« بسيانس » شجرة كثيرة الوجود أزهارها حمراء قرمزية تزهر ابتداء من
شهر مايو أوراقها ريشية متساقطة شتاء والتكاثر بواسطة البذور

Polygonatum Tuberosa

Amaryllidaceae

« الزنيق » - نبات بصلى أزهاره بيضاء عطرية للغاية تزرع أبيضه في أرض
خفيفة معنى بها وذلك في مارس وأبريل والأزهار ترى صيفا وفي الخريف وبعد الانتهاء
من التزهير تخزن الأصيل للزراعة في الموسم التالي

Populus

Salicaceae

« الحور » . أنواعه عديدة والمشهور منها بمصر الحور الأبيض والحور الأفرنجي
والحور الأسود البلدى ، الأول ليس له قيمة من حيث التظليل ولكن خشبه من
أصلح أنواع الخشب ويتكاثر بالفسائل وتتميز أوراقه بلونها الأبيض الصوفى من

Phlox



Papaver





Verdena

ناحيتهما السفلية P . alba

أما الخور الأفريقي P . deltoides فشجرته كبيرة والأوراق عريضة ويتكاثر بالقل - ويلاحظ أن أفرعه متوسطة الانتشار - وتختلف عن الخور الأسود P . nigra في كون أفرعه لا تنتشر انتشار أفرع الخور الأفريقي وتستعمل أخشاب الخور في تلويح الأراضي وعمل بعض الآلات الزراعية كالنواف الخ .

Portulaca

Portulacaceae .

« رجلة زهور » . حولي صيفي قصير تزرع بزوره في مارس وألوان الأزهار كثيرة .

Portulacaria afra

Portulacaceae

شجيرة قصيرة أوراقها تشبه الرجلة لحمية ومن أصلح النباتات للزراعة في الجبلات وتكاثر بالعقاة .

Pothos Aurea

Aroideae

« باطوس » . تسلق أوراقه بيضه لامعة سرقطة باللون الأبيض المصفر . ينجح في الأماكن الظليلة الرطبة والتكاثر بالترقيد .

Primula

Primulaceae

برميولا . حوليات شتوية تربي عادة في القصارى داخل الصوب الخشبية والوان الأزهار بيضاء أو حمراء أو قرنفلية الخ . وتزرع البنور في يونيو ومن أنواعها المعروفة P . Malacoides — P . obconica . P . Stellata

Pritchardia

Palmaceae .

برتشارديا . نخيل للزينة يرى بكثرة ساقه سميكه نواها أوراقه مروحية لامعة تتدلى منها خيوط رفيعة دقيقة ويتكاثر بالبنور .